

Порядок организации проведения вакцинации детей в медицинской организации в условиях предотвращения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

1. Вакцинацию детского населения проводить в медицинской организации строго с соблюдением требований санитарного законодательства.

2. Организация работы персонала медицинской организации:

- к работе допускается персонал без признаков заболевания ОРВИ (перед началом работы провести термометрию и осмотр). При наличии повышенной температуры (37 и выше) или наличии симптомов ОРВИ не допускать до работы;

- в течение всего рабочего дня использовать средства индивидуальной защиты;

- разделить весь персонал на смены, чтобы сотрудники одной смены не пересекались с другой.

3. Организация проведения вакцинации детского населения:

- проведение вакцинации строго по предварительной записи (не более 20 человек в смену, с промежутком приема через 20-30 минут). Во время записи предупреждать пациентов о необходимости использования масок и одноразовых перчаток;

- не допускать в поликлинику лиц без масок и перчаток

- организовать допуск пациентов в медицинскую организацию через специально выделенный фильтр после проведения термометрии и осмотра медицинским работником. При наличии повышенной температуры (37 и выше) или наличии симптомов ОРВИ необходимо отменить посещение и рекомендовать вызвать врача-педиатра участкового на дом;

- информировать пациентов о том, что во время пребывания в медицинской организации должны быть в масках и одноразовых перчатках;

- с целью соблюдения предусмотренной дистанции между пациентами, между пациентами и сотрудниками необходимо: допускать пациентов в помещения и места ожидания только при наличии свободных площадей (1,5 – 2 метра). Не допускать нахождение более трех пациентов с учетом социальной дистанции у одного кабинета прививочного кабинета;

- в графике приема делать 20-30 минутные перерывы между ними для санитарной обработки и проветривания помещений.